



- ✦ Tranquilizante para la manipulación de animales difíciles y ante situaciones estresantes
- ✦ Efecto antiemético
- ✦ Premedicación antes de la anestesia
- ✦ En postoperatorio, proporciona un despertar tranquilo

ACEPROLAB

5 mg/ml Solución inyectable



LabianaPets


www.labianapets.com

Sumamos eficacia, sumamos compromiso



Mecanismo de acción de la acepromazina

Bloqueo de receptores dopaminérgicos



COMPOSICIÓN POR ML

Maleato de acepromazina 5 mg.

INDICACIONES DE USO

- Tranquilizante para la manipulación de animales difíciles y/o ante situaciones estresantes para el animal (exploraciones clínicas, realización de pruebas diagnósticas, mareo por movimiento, etc.).
- Premedicación antes de la anestesia, permitiendo reducir las dosis necesarias de analgésicos y anestésicos generales y contrarrestando el efecto emético de los opiáceos.
- En el postoperatorio, para proporcionar un despertar tranquilo.

POSOLOGÍA Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Perros:

Tranquilización sin anestesia posterior: 0,2 – 0,4 ml/10 kg p.v. por vía IM.

Premedicación para la anestesia: 0,02 – 0,1 ml/10 kg p.v. por vía IM.

Sedación postoperatoria: 0,02 – 0,1 ml/10 kg p.v. por vía IV.

Gatos:

Tranquilización sin anestesia posterior: 0,02 – 0,04 ml/kg p.v. por vía IM.

Premedicación para la anestesia: 0,01 - 0,02 ml/kg p.v. por vía IM.

Sedación postoperatoria: 0,002 - 0,01 ml/kg p.v. por vía IV.

Cuando se emplea como preanestésico-potenciador de la anestesia general, la dosis del anestésico puede reducirse entre un 30 y un 50%.

CONTRAINDICACIONES

- No usar en animales debilitados (ancianos, leucopénicos, etc.), deshidratados, anémicos, hipotensos, hipovolémicos o en shock.
- No usar en caso de disfunción hepática, cardíaca o renal.
- No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.

REACCIONES ADVERSAS

En muy raras ocasiones puede producirse:

- Hipotensión, bradicardia, bradipnea y disminución de la temperatura corporal.
- Excitación, especialmente cuando se dan dosis excesivas o en animales muy sensibles.

USO DURANTE LA GESTACIÓN O LA LACTANCIA

No utilizar durante el último tercio de gestación.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS

La acepromazina potencia la toxicidad de los organofosforados, por lo que no debe usarse para controlar los temblores asociados con el envenenamiento por fosfatos orgánicos, ni tampoco junto con organofosforados vermífugos o ectoparasiticidas, incluyendo collares antipulgas.

PRESENTACIONES

Viales de 25 ml y 100 ml.

Registro nº: 3934 ESP.

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración bajo control o supervisión del veterinario.